

PAKENDI INFOLEHT
Itradrops - aspergilloosi, kandidoosi ja dermatofütoosi raviks

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1ml sisaldab: 10mg itrakonasooli.

LOOMALIIGID

Puurilinnud, tuvid ja turteltuvid, mitte tööstuslikult peetavad närilised.

NÄIDUSTUS(ED)

Trichophyton mentagrophytes ja Microsporium canis poolt põhjustatud aspergilloosi, kandidoosi ja dermatofütoosi raviks.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI

Aspergilloos:

5-10 mg / kg kehamassi kohta, üks kord päevas (= 0.5 - 1 ml / kg kehamassi kohta) minimaalselt 21. järjestikusel päeval.

Kandidoos:

10 mg / kg kehamassi kohta, üks kord päevas, 7-21. järjestikusel päeval.

Dermatofütoos:

10 mg / kg kehamassi kohta, üks kord päevas, 14. järjestikul päeval.

Aafrika hallpapagoi ravi annus on 2.5-5mg / kg kehamassi kohta, 1 kord päevas.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Ainult suukaudseks manustamiseks.

Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole soovitatav.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada loomadele, kellel esineb ülitundlikkus itrakonasooli või teiste koostisosade vastu. Mitte manustada loomadele kellel esinevad neeru- või maksapuudulikkus. Mitte manustada koos tsisapriidi sisaldavate ravimitega.

KÕRVALTOIMED

Võivad esineda kerged ja mööduvad kõrvaltoimed, sh oksendamine, kõhulahtisus, suurenenud süljeeritus, anoreksia, depressioon, apaatsus.

Aafrika hallpapagoi on eriti tundlik kõrvaltoimete suhtes, eriti anoreksia ja depressiooni osas. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb manustamine lõpetada. Kõrvaltoimete möödumisel võib proovida ravi jätkata väiksemate annustega.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida originaalpakendis.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Mitte hoida külmikus, mitte külmutada.

ERIHOIATUSED

Ravimi manustamine koos toiduga või vähendada ravimi imendumist, seetõttu on soovitatav ravimit manustada toidukordade vahel. Pärast manustamist tuleb doseerimissüstal korralikult pesta ja kuivatada enne uuesti kasutamist.

Dermatofütoosi ravi ajal tuleb desinfitseerida looma eluruumi. Dermatofütoosi ravi võib kombineerida koos välispidise raviga. Desinfitseerimist koos teiste hügieenimeetmetega tuleks jätkata ka pärast ravi. Infektsiooni ennetamiseks tuleb ravi saav loom tervetest loomadest eraldada.

PAKEND

50 ml viaal.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS

Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadusandlusele.

TOOTJA või MÜÜGILOAHOIDJA

AST Pharma, Holland

LISAINFORMATSIOON

Maxx Pharma OÜ

Kaluri tee 5, Haabneeme, 74001, Viimsi

Tel +372 650 6087

www.maxx.ee